

ARBRE DECISIONNEL POUR SOINS DE BOUCHE

Soins pluri-quotidiens préventifs pour protéger et maintenir l'intégrité de la cavité buccale

Brossage des dents ou des prothèses au dentifrice _ recherche d'ulcérations, de gingivite, d'hyposialie _ hydratation

Bouche SAINE

Rôle propre : mesures d'hygiène buccale de base

Cavité buccale : protocole BI CARBONATE* - Lèvres : vaseline, Cold Cream, pommade au Calendula - si O2 masque : gel lubrifiant KY®, gel humectant BIOXTRA®

BOUCHE SÈCHE

Rôle propre : soins d'hygiène + Protocole BI CARBONATE 4 x / jour

BOUCHE SALE

Si dépôts, croûtes : gel BIOXTRA® / 2 h le premier jour, puis 4 x /jour pour ramollir, puis détersion à la brosse à dents souple

BOUCHE DOULOUREUSE

PLAIE, APHTOSE, MUCITE...

Traitement local

Bains de bouche à la MORPHINE®

1 amp de 10 mg dans 10 ml de NaCl 0,9 % ou d'eau stérile

Application de XYLOCAÏNE VISQUEUSE® 2 % GEL ORAL

(à effectuer une heure avant les repas pour éviter les risques de fausses routes)

Antalgiques par voie générale

y compris de palier 3 si nécessaire

BOUCHE INFLAMMATOIRE ET/OU ULCÉRÉE

Traitements locaux particuliers des ulcérations

Bain de bouche avec

ULCAR® 1g suspension

buvable : 2 sachets dans 1 verre d'eau, 4 fois par jour (après les repas), ou directement sur les lésions

Antalgiques par voie générale, et traitement spécifique de l'Herpès

BOUCHE HÉMORRAGIQUE

Hémostatique local

Soit en gargarisme, soit sur compresse imbibée :

COALGAN® soluble dans l'eau bicarbonatée

ALGOSTÉRIL® (mèches ou compresses) soluble dans l'eau bicarbonatée

EXACYL® Solution

buvable : imbiber une compresse, appliquer sur la zone

BOUCHE MYCOSIQUE

FUNGI ZONE® solution

buvable ou TRI FLUCAN®

50 mg suspension

buvable (1 mesure) : en

gargarisme puis avaler DAKTARI N® 2% gel buccal : 2 mesures, 4 x/j à conserver 2 à 3 mn en bouche

LORAMYC® 50 mg

comprimé gingival muco-adhésif : 1 fois par jour pendant 7 à 14 jours

BOUCHE MALODORANTE

Bains de bouche

EAU OXYGÉNÉE 10 %

(100ml) + SÉRUM PHYSIOLOGIQUE (300 ml)

Applications locales

FLAGYL® suspension

buvable 4% : pure en badigeon 4 à 6 fois / j sur une compresse ou à l'aide d'un bâtonnet mousse

* protocole BI CARBONATE Bains de bouche si possible à garder 3 minutes en bouche, et/ou nettoyage de la langue et de la cavité buccale avec bâtonnets mousse, 10 à 15 minutes après les repas, avec soit

- Bicarbonate de Na poudre : 1 cuiller à café dans un grand verre d'eau ; stabilité 24h
- Bicarbonate de Na 1,4 % (prescription médicale) : sans dilution ; stabilité 24h à 48h au réfrigérateur